

Je neemt een gliflozine voor diabetes: wat moet je weten?

Het gaat om
Invokana® (canagliflozine),
Forxiga® (dapagliflozine) of
Jardiance® (Empagliflozine)

Hoe werken ze?

Deze geneesmiddelen zorgen ervoor dat je meer suiker langs de urine verliest. Dat is de bedoeling: zo zakt het suikergehalte in je bloed.

Deze geneesmiddelen worden meestal goed verdragen.

Maar ze kunnen wel voor enkele bijwerkingen zorgen:

- Gemakkelijker **infecties krijgen van de blaas of de genitale streek**. Dit kan zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomen. In zeldzame gevallen kunnen die infecties zeer ernstig zijn.
- **Meer plassen en sneller uitgedroogd raken**. Je merkt dat doordat je meer dorst hebt, duizelig bent, en in extreme gevallen flauwvalt.
- Meer **voetproblemen**, zoals wonden en zweren. Goede voetverzorging is daarom extra belangrijk.
- Een zeldzame maar zeer gevaarlijke bijwerking is **keto-acidose**, of **verzuring van het bloed**. Dit kan voorkomen op momenten dat je ziek bent met koorts en braken, wanneer je langere tijd erg weinig eet, of wanneer je een zware operatie ondergaat.

Neem dus contact op met je arts wanneer:

- je last hebt van **genitale jeuk of afscheiding of pijn tijdens het plassen**.
- je last hebt van **duizeligheid, zwakte**, of (het gevoel te zullen) flauwvallen.
- je een wondje of zweer aan de **voeten** hebt.
- je meer dan 24 uur **koorts** hebt, **braakt**, **diarree** hebt, of niet kan eten.
- er een **operatie** gepland staat.

Je arts kan dan oordelen of een bijkomende behandeling nodig is, of dat je behandeling moet worden aangepast of (tijdelijk) gestopt moet worden.

Neem *dringend* contact op met je arts (of arts van wacht) als:

- 
- je ernstige **buikpijn** hebt, **braakt**, je **slaperig en zwak** voelt. Dit kan een teken zijn van keto-acidose (verzuring van het bloed).
 - je last hebt van veel **pijn, zwelling of roodheid in de genitale streek**, zeker wanneer je ook **koorts** hebt.

